



Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda, Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G7.UBK
Tanım	Kolorektal kanser tanılı hastalarda, postoperatif iki yıl içerisinde total kolonoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Paydadaki hastalarda taburculuk tarihinden itibaren iki yıl içinde en az bir defa total kolonoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: 701.450 Kolonoskopi, total 701.460 Kolonoskopik polipektomi Payda: KR. Tablo 5 KR. Tablo 2
Hedef Değer	≥%70
Hedef Grup	18 yaş ve üstü hastalar
Hariç Tutulacaklar	Ölen hastalar
Teknik Notlar	Paydayı elde etmek için; 1. KR. Tablo 5 'deki SUT kodlarından herhangi birini alan operasyonlar bulunur. 2.Birinci maddede bulunan operasyonlar içinden; <ul style="list-style-type: none">Operasyon* tarihinden itibaren 60 gün içerisindeKolorektal Ca ICD 10 kodlarından (KR. Tablo 2) herhangi birini, herhangi bir kurumdaAna veya ek tanı olarak alan hastalar çekilir. <i>* Hastanın birden fazla operasyonu varsa ilk operasyonu alınır.</i> Payı bulmak için; 1.Paydanın içindeki hastalardan; <ul style="list-style-type: none">İlgili hastanın taburculuğundan itibaren iki yıl içerisindePay veri kaynağındaki total kolonoskopi SUT kodlarından herhangi birini herhangi bir kurumda alan hastalar çekilir. Örnek: 15 Ocak tarihinde taburcu olan hastalar iki yıl sonraki 15 Ocak tarihine kadar izlenecektir.
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	SHGM, SKAÇHDB, İl Klinik Kalite Birimi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi